

Sēkluva

SĒKLOS
profesionalams
ir mēgējams



KATALOGAS

TURINYS

POMIDORAI	04
PAPRIKOS	10
AGURKAI	12
POSKIEPIAI	15
BAKLAŽANAI, CUKINIJOS, MELIONAI	16
ARBŪZAI, MOLIŪGAI	18
MORKOS	20
GŪŽINIAI KOPŪSTAI	21
ŽIEDINIAI KOPŪSTAI, BROKOLIAI	22
KITOS KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS	23
BUROKĖLIAI	25
RIDIKĖLIAI, RIDIKAI	26
ŽIRNIAI	28
PUPOS, PUPELĖS	30
SALIERAI, KUKURŪZAI	32
PORAI, TUŠČIALAIŠKIAI ČESNAKAI	34
SALOTOS, ŠPINATAI	36
KRAPAI, PETRAŽOLĖS	39
PRIESKONINIAI AUGALAI	41
BRAŠKĖS, ŽEMUOGĖS	43
SVOGŪNŲ SĖJINUKAI	44
SĖKLINĖS BULVĖS	45
ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI VEJOMS	46
PAŠARINIAI ŠAKNIAVAISIAI	46
DARŽOVIŲ SĖKLOS	47


Prekyba internetu: www.sekluva.lt

Didmeninė prekyba sėklomis:

Vievyje, Vilniaus g. 37, tel. +370 5 282 7017, +370 5 282 6292
El. p. prekyba@sekluva.lt; info@sekluva.lt

**Mažmeninė prekyba sėklomis ir kitomis prekėmis
sodui bei daržui šiose parduotuvėse:**

Vilniuje, Savanorių pr. 176 („Norfos Bazė“ pastate), tel. +370 655 52 567
Vilniuje (prie Kalvarijų turgaus), Kalvarijų g. 66, tel. +370 5 232 4215
Kaune, V. Krėvės pr. 81, tel. +370 37 352 572
Utenoje, Kauno g. 19, tel. +370 389 50 001
Vievyje, Trakų g. 13 tel. +370 5 282 6210
Ukmergėje, Kauno g. 2, tel. +370 340 44 111
Marijampolėje, V. Kudirkos g. 47 C, tel. +370 343 25 555



DOSSIMO F₁

- Hibridas augintinas įvairių tipų šiltnamiuose.
- Atsparus ligoms Tm, TSWV, C5, F2, V, Fr.
- Augalų tarpbambliai trumpi. Ant stiebų išauga nuo; 6 iki 12 kekių.
- Vaisiai apie 220 g svorio, tvirti, nelinkę sirgti viršūniniu vaisių puvinium, itin skanūs.



GOURMANSUN F₁

- Hibridas augintinas šiltnamiuose.
- Augalai atsparūs ligoms Tm, TSWV, F2.
- Vaisiai širdies formos, geltoni su oranžiniais dryžiais, mėsingi, 200–250 g svorio, itin skanūs, kvapūs, beveik be sėklų.



SIDRA F₁

- Ankstyvas hibridas, augintinas šiltnamiuose.
- Augalai atsparūs ligoms V, F2, Tm, TSWV, puikiai mezga vaisius net per karščius.
- Kekės auga labai arti viena kitos.
- Vaisiai dvispalviai, raudoni ir tamsiai violetiniai, 90–100 g svorio.



CANOVA F₁

- Hibridas augintinas šiltnamiuose atsparus ligoms Tm, V, F2, C5, Fr, TSWV, N, TYLCV.
- Vaisiai plokščiai apvalūs, su ilgais taurėlapiais, labai gražios prekinės išvaizdos.
- Sveria 200–250 g, nelinkę trūkinėti, tvirti.
- Kekėse auga po 5–6 vaisius.



POMIDORAI



POMIDORŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės
Hibridai su apvaliais ir plokščiai apvaliais vaisiais					
BELLADONA F ₁		VA	Tm, V, F2	250–300	Užaugina penkias kekes, pakenčia temperatūrų svyravimus ir šviesos trūkumą. Vaisiai mėsingi.
BRILLANTE F ₁		A	Tm, V, F2	150–200	Išaugina labai gausų derlių. Vaisiai tinkami ilgiau laikyti ir pervežti.
CALIFFO F ₁			F2, V, Fr, TYLCV	Apie 450	Vaisiai šiek tiek briaunoti, nelinkę trūkinėti, kekėse auga po 3–4, itin skanūs.
CELESTEEN F ₁		A	C5, Tm, V, F2, Fr, N, TSWV	200–250	Vaisiai puikios kokybės išlieka per visą derėjimą.
CRISTAL F ₁		VA	Tm, V, F2, St, C5	120–140	Augalai lengvai prisitaiko prie aplinkos sąlygų. Vaisiai skanūs.
FANTASIO F ₁		VA	Tm, Ph, C3, TSWV, V, N	180–200	Labai atsparus marui ir kitoms ligoms.
FLEMING F ₁		VV	ToBRFV, Tm, V, F2, C5, Fr, TSWV, N, TYLCV	220–250	Vaisiai kekėse auga po 4–5, nesmulkėja iki pat derėjimo pabaigos. Skinti tinka tiek pavienius vaisius, tiek kekes.
HORUS F ₁		A	C5, Tm, V, F2, Fr	Apie 140	Gausiai dera. Vaisius patogų marinuoti.
MAHITOS F ₁		A	Tm, TSWV, N, C5, F2, Fr, V	220–260	Puikiai mezga vaisius ir nepalankiomis sąlygomis.
SARATOGA F ₁		VA	C5, Tm, F2, Fr, V, N, TYLCV	150–170	Puikiai mezga vaisius ir per karščius. Išaugina labai stiprią šaknų sistemą ir sunokina itin skanius vaisius.
SPARTACO F ₁		VA	F2, V, Tm, C5, N	250–300	Nuskinti vaisiai ilgai išlaiko išvaizdą ir skonį.
TAMARIS F ₁		A	Tm, V, F2	160–180	Vienas iš populiariausių hibridų.
TOMOSA F ₁		A	C5, Tm, F2, V, N, Si	80	Stiebai su trumpais tarpbambliais, todėl kekės auga arti viena kitos. Vaisiai auga labai gausiose kekėse. Tinka ilgiau laikyti ir marinuoti.



POMIDORŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės
Hibridai su avietiniais vaisiais					
ALEGRIA F ₁		A	V, F, TMV, N	300–350	Pusiau determinantinis hibridas. Vaisiai labai skanūs.
CLAROSA F ₁		A	Tm, V, F2, Fr, N, TSWV, TYLCV	220–250	Vaisiai puikią kokybę išlaiko per visą derėjimą.
ESMIRA F ₁		A	Tm, V, F2, St, C5	190–210	Kekės išsidėsčiusios arti viena kitos.
FENDA F ₁		A	C3, Tm, V, N, TSWV, TYLCV	Apie 200	Vaisiai išvaizdūs ir skanūs.
HONEY MOON F ₁		VA	Tm, V, F2, TYLCV	250–300	Vaisiai nepaprastai skanūs.
KONGO F ₁		A	Tm, V, F3, C5, Lt, N, TSWV, Ss	Apie 200	Dailiose kekėse vaisiai užauga vienodi, nuskinti ilgai išlieka kokybiški ir skanūs.
KWINTELLA F ₁		LA	C5, Tm, F2, TYLCV, V, N	220–250	Augalus paprasta auginti. Vaisiai mėsingi, skanūs.
LOARA F ₁		LA	F2, C5, Tm, V, N	200–220	Augalai išaugina 6–8 kekes, nelinkę sirgti viršūniniu vaisių puvinio, tvirti ir skanūs.
MANISTELLA F ₁		VA	C5, F2, Tm, TYLCV, Ss, TSWV, V, N	250–300	Labai gausiai dera. Vaisiai kokybiški, labai skanūs.
PINK WONDER F ₁		A	C5, F2, Tm, V	Iki 200	Vaisiai mėsingi, labai skanūs. Augalai subrandina daug vaisių.
RUGBY F ₁		A	Tm, V, F2	160–180	Vaisiai forma panašūs į siaurą širdį, mėsingi ir labai skanūs.



CLAROSA F₁



KONGO F₁



RUGBY F₁

POMIDORŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės
Hibridai su „Jaučio širdies“ tipo vaisiais					
CORAZON F ₁		V	V	Apie 200	Gausiai dera. Vaisiai briaunoti, mėsingi.
CUPIDISSIMO F ₁		VA	Tm, V	Apie 200	Ilgas derėjimo laikotarpis.
GOURMANDIA F ₁		LA	Tm, V, F2, N	250–300	Augalai pradeda derėti itin anksti ir gausiai.
SILVANO F ₁		VA	Tm, V, TSWV	Iki 350	Vaisiai briaunoti, mėsingi, labai skanūs.
Hibridai su ovaliais ir pailgais vaisiais					
ARMIRA F ₁		VA	Tm, F2, Fr, V, N	180–200	Ilgas vegetacijos periodas. Vaisiai mėsingi, tvirti.
BELLANDINE F ₁		VA	F2, V, N	200–230	Vaisiai forma panašūs į kūgines paprikas, mėsingi, turi mažai sulčių ir beveik be sėklų, todėl labai tinka džiovinti, tyrėms ir salotoms gaminti. Rečiau nei kitos veislės serga viršūniniu vaisių puvinio.
BESTIAL F ₁		VA	Tm, V, F2, N, TSWV	160–180	Augalai labai gausiai dera. Vaisiai kekėse auga po 5–6.
COLIBRI F ₁		VA	Tm, V, F2, Fr, N, Ss	120–140	Vaisiai labai skanūs, juos patogiu konservuoti.
CORSARO F ₁		VA	F2, V, Tm	130–150	Vaisiai apie 12 cm ilgio. Kekės ilgos.
FELLINI F ₁		VA	TSWV, F2, V, N	110–120	Vaisiai ovalūs, apie 8 cm ilgio, mėsingomis sienelėmis, skanūs.
GIULIETTA F ₁		VA	Tm, C2, V, N	150–170	Augalai itin gausiai dera. Vaisių kekės ilgos.
TUCANO F ₁		VA	Tm, V, F2, N, TSWV	180–200	Sunokina neįprastai daug skanių vaisių.



CORAZON F₁



BELLANDINE F₁



FELLINI F₁

POMIDORŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės		
Hibridai su kitokios spalvos vaisiais							
BENDIDA F ₁		VA	Tm, V, F2	180–200	Augalai išaugina 6–7 kekes.		
COSTANTINO F ₁		VA	Tm, N	85	Augalai labai gausiai dera. Vaisiai rudi su raudonu atspalviu, saldūs, nuskinti ilgai nepraranda natūralaus skonio.		
LEELOO F ₁		A	Lt, F2, V, Tm	150–170	Vaisiai 6,7–7,7 cm skersmens, išvaizdūs, labai mėsingi ir skanūs. Kekėse auga po 5–6. Nuskintas derlius ilgai nepraranda geros išvaizdos ir natūralaus skonio.		
LEMON BOY F ₁		A	V, F2, N, A, St	170–180	Vaisiai tinkami dietinei mitybai.		
NIKOLINA F ₁		A	V, F2, Tm, Ph, TSWV, Fr, TYLCV	250–270	Tai vienas iš skaniausių vaisius išauginančių hibridų. Vaisiai briaunoti, šokoladinės spalvos, su žaliomis „skraistėmis“.		
SIBARITA F ₁		VA	F2, V, Tm, N	70–80	Vaisiai rausvai rudi, panašūs į „Kumato“. Labai skanūs.		
SIDRA F ₁		A	V, F2, Tm, TSWV	90–100	Augalai puikiai mezga vaisius net per karščius. Vaisiai dvispalviai, raudoni ir tamsiai violetiniai.		
VIPON F ₁		A	Tm, F2, V, N	35–40	Vaisiai mėsingi, tamsūs su žaliais dryželiais, labai skanūs tiek švieži, tiek marinuoti.		
ZAIRA F ₁		VA	V, F2, N, Tm, TYLCV	120–140	Puikiai mezga vaisius ir karštą vasarą. Vaisiai tvirti, netrūkinėja, labai gražūs ir skanūs.		
Hibridai su smulkiais vaisiais							
APRIKOLA F ₁		A	Tm, F2	20–25	Vaisiai labai saldūs, prinokę netrūkinėja ir nenukrenta. Kekėse užauga po 20–25 vaisius.		
DELIKANO F ₁		LA		40–60	Augalai labai gausiai dera. Vienoje kekėje sunoksta apie 10–12 vaisių. Tinka marinuoti ir džiovinti saulėje.		
LUCIPLUS F ₁		VA	Tm, F2, V, N, Pst, Ss	20–30	Vaisiai tvirti, labai saldūs ir skanūs.		

POMIDORŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Atsparumai ligoms	Vaisiaus svoris (g)	Kitos savybės		
Hibridai su smulkiais vaisiais							
LUTHER F ₁		A	F2, Tm, V, Fr, N	20–25	Sunokę vaisiai šokoladinės ar tamsiai vyšninės spalvos, saldūs, netrūkinėja.		
MANDAT F ₁		A	Tm, F2	10–15	Kekės ilgos, jose sunoksta po 20–25 vaisius.		
NUGGET F ₁		VA	Tm, F2, Fr	20	Vaisiai labai skanūs.		
PANDORINO F ₁		VA	F2, V, Tm, N	20	Vaisiai forma panašūs į mažas slyvutes.		
GOLDWIN F ₁		A	F2, V, Tm	18–22	Vaisiai auga ilgose kekėse, saldžiarūgščiai, labai skanūs ir kvapūs, nelinkę skilinėti.		
SUMMER SUN F ₁		VA	Tm, F2, V, N	15–25	Vaisiai nepaprastai saldūs ir skanūs.		
TWITTER F ₁		A	F2, Tm, N, V, TYLCV	30–35	Kiekvienoje kekėje sunoksta po 18–20 vaisių. Labai ilgai ir gausiai dera.	SUMMER SUN F ₁	
Determinantiniai (riboto augimo) hibridai							
DYNO F ₁		A	Tm, V, F3, N	90–130	Puikiai dera tiek karštesnę, tiek vėsesnę vasarą.		
DURICCHIO F ₁		VA	V, F2	220–230	Gausiai dera. Vaisiai ilgai nepernoksta, turi mažai sėklų.		
PEGASO F ₁		A	Tm, V, F2, Pst, N	Apie 150	Augalai labai gausiai dera. Lapai gerai uždengia vaisius nuo saulės kaitros.		
PUMATIS F ₁		A	F2, Pst, V, N	60–65	Vaisiai saldūs, labai tvirti. Tinka ilgai laikyti, džiovinti, raugti.		
RED DEUCE F ₁		A	Tm, F2, V	250–300	Šaknų sistema stipri. Vaisiai tvirti, mėsingi, labai skanūs. Labai tinka padažams gaminti.		
RED MORNING F ₁		LA	Tm, V, F2	Apie 300	Augalai labai greitai auga ir anksti subrandina derlių. Vaisiai plokščiai apvalūs, labai skanūs, todėl tinka ir padažams gaminti.	TWITTER F ₁	

Atsparumai ligoms: Tm – pomidorų mozaikos virusui; V – verticiliozei (lėtajam vytuliui); F2 – fuzariozei (greitajam vytuliui) 1 ir 2 rasei; Fr – fuzariniam šaknų puvinii; C3 – kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei) 1-3 rasei; C5 – kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei) 1-5 rasei; N – nematodams; TSWV – dėmėtajam lapų vytuliui; TYLCV – pomidorų mozaikos geltonajam virusui; A – sausligei, Pst – bakteriozei, Ph – fitoftorozei (marui), Ss – stemfiliozei, St – pilkajai lapų dėmėtligei, Si – sidabraligei.

SOLARIO F₁

- Labai ankstyvas hibridas iš Prancūzijos.
- Augalai labai atsparūs ligoms.
- Vaisiai stambūs, 10×12 cm dydžio, apie 250 g svorio.
- Sienelės storos, sultingos, labai skanios.



NAVIGATOR F₁

- Ankstyvas hibridas.
- Vaisiai šiek tiek suploto kūgio formos, 16–18 cm ilgio, 160–200 g svorio.
- Sienelės mėsingos, saldžios ir kvapios.

VELVET F₁

- Ankstyvas hibridas.
- Vaisiai ištempto kubo formos, 16×10 cm dydžio, 350–400 g svorio.
- Prinokę vaisiai būna ryškiai geltoni, blizgūs, labai saldūs, itin skanūs.

CHOUCA F₁

- Ankstyvas hibridas.
- Vaisiai saldūs, 250–280 g svorio, storomis sienelėmis.
- Augalai labai atsparūs ligoms, gerai mezga vaisius esant temperatūrų svyravimams.



PAPRIKOS



PAPRIKŲ hibridinės (F ₁) veislės						
Hibridinė veislė	Spalva, forma	Ankstyvumas	Vidutinis svoris (g)	Dydis	Kitos savybės	
ANDROMEDA F ₁		A	Apie 300	7×8	Vaisiai tamsūs, beveik juodi, storomis sienelėmis, labai kvapūs ir skanūs.	
ARLEQUIN F ₁		VA	Apie 140	5×18	Išaugina labai daug kokybiškų vaisių.	
BIXIO F ₁		A	300–320	8×10	Gausiai dera. Sunokę vaisiai oranžiškai raudoni, gražios išvaizdos ir skanūs.	
CARMA F ₁		A	Apie 140	6×16	Gerai pakelia karščius. Vaisiai nesmulkėja viso sezono metu. Sunokę būna gelsvai oranžiniai ar oranžiškai raudoni.	
CYNTHIA F ₁		A	Apie 150	14×6	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Vaisiai bukais galais, visiškai sunokę būna raudoni, išvaizdūs.	
KADMIO F ₁		VA	340–350	8×16	Sunokę vaisiai būna tamsiai raudoni, labai storomis sienelėmis.	
KROMO F ₁		A	360–380	10×14	Vaisiai gražios išvaizdos ir skanūs.	
RODRIGO F ₁		VA	Apie 250	10×10	Vaisiai mėsingi, be mažyčių įtrūkimų.	
ROGER F ₁		A	Apie 40 g	3×8	Užaugina labai daug vaisių. Jų sienelės maždaug 5 mm storio, saldūs (7 briksai) ir skanūs.	
SOLANOR F ₁		A	Apie 250	10×12	Vaisiai storomis sienelėmis. Nuskinti ilgai išlaiko puikią išvaizdą ir skonį.	
SPRITZ F ₁		A	220–230	7×9	Vaisiai storomis sienelėmis, labai kokybiški, skanūs ir labai saldūs.	

AMERIGO F₁

- Ankstyvas partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke tiek ankstyvam, tiek vėlyvesniam derliui gauti.
- Augalai puikiai pakenčia nepalankias aplinkos sąlygas, išaugina galingą šaknų sistemą.
- Vaisiai su stambiais kauburėliais, 12–14 cm ilgio, 120–130 g svorio, išauga vienodi, neapkarsta.
- Peraugę išlieka cilindriški, neįgauna statinaitės formos.
- Tinka marinuoti ir raugti.



ANVAR F₁

- Ankstyvas partenokarpinis hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke.
- Užaugina itin gausų derlių. Augalų šaknų sistema stipri, atspari puviniams.
- Ūglių tarpubambliai trumpi. Lapų pažastyse išauga po 2–4 tamsiai žalius vaisius. Jų odėlė su stambiais kauburėliais, mažomis sėklinėmis, skanūs.
- Tinka marinuoti ir ypač raugti.

ILONARA F₁

- Ankstyvas partenokarpinis hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke.
- Augalų tarpubambliai ir šoniniai ūgliai trumpi, šaknų sistema stipri.
- Vaisiai užauga vienodi, 12–14 cm ilgio, mažomis sėklinėmis, traškūs ir labai skanūs, neapkarsta.
- Lapų pažastyse užsimezga po 1–2 agurkus, kurių odėlė su stambiais kauburėliais, plona. Peraugdami agurkai nestorėja, o tįsta.
- Vaisiai tinkami marinuoti ir raugti.



KONZERT F₁

- Ankstyvas partenokarpinis hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke.
- Augalai sparčiai auga, anksti pradeda derėti, gerai ištvėria aukštesnę temperatūrą ir temperatūrų svyravimus.
- Lapai nedideli, melsvai žali, nes turi daug chlorofilo. Dėl šios priežasties augalai išaugina stipresnę šaknų sistemą, yra atsparesni ligoms, baltasparniams, tripsams, o ypač voratinklinėms erkėms.



AGURKAI



AGURKŲ hibridinės (F ₁) veislės				
Hibridinė veislė	Kauburėliai	Ankstyvumas	Tinka raugti, marinuoti	Kitos savybės
Partenokarpinių agurkų hibridinės (F ₁) veislės				
ADAM F ₁	Stambūs	LA	M	Augalai greitai auga, todėl tinka auginti tiek pirmoje, tiek antroje vasaros pusėje.
CHAIKOVSKIY F ₁	Stambūs	A	M, R	Sukurtas auginti šiltnamiuose. Šoniniai ūgliai trumpi, šaknų sistema stipri.
CANTARA F ₁	Stambūs	A	M, R	Daugiavaisis hibridas, išleidžia mažai trumpų šoninių ūglių.
DIRIGENT F ₁	Smulkūs	A	M	Dera labai gausiai. Vaisiai itin skanūs.
GERSHWIN F ₁	Stambūs	VA	M, R	Vienas iš geriausių hibridų tinkamų raugti.
LENARA F ₁	Stambūs	A	M, R	Sukurtas auginti šiltnamiuose. Šoniniai ūgliai trumpi.
KALIMERO F ₁	–	A	–	Vaisiai salotinio tipo, tamsiai žali, 10–14 cm ilgio, neapkarsta, tvirti. Odėlė lygi, be kauburėlių.
KARAOKE F ₁	Stambūs	A	M, R	Vienas iš atspariausių ligoms hibridų.
KITTO F ₁	Stambūs	VA	M, R	Vaisiai 11–13 cm ilgio, nuskinti ilgai nepraranda išvaizdos ir skonio, tinkami pervežti.
KYBRIA F ₁	Stambūs	LA	M, R	Vienas iš populiariausių daugiavaisių hibridų.
LISZT F ₁	Stambūs	A	M, R	Hibridas sukurtas auginti lauke, bet augintinas ir šiltnamiuose, ilgai dera. Lapai maži, vaisiai puikios kokybės.
MAJESTOSA F ₁	Smulkūs	A	M	Ūglių tarpubambliai trumpi, lapai maži, todėl patogu rinkti gausų derlių.



AGURKŲ hibridinės (F₁) veislės


Hibridinė veislė	Kauburėliai	Ankstyvumas	Tinka raugti, marinuoti	Kitos savybės	
Partenokarpinių agurkų hibridinės (F ₁) veislės					
MERENGUE F ₁	Stambūs	LA	M, R	Augalai atsparūs netikrajai miltligei.	
MIRABELLE F ₁	Stambūs	LA	M, R	Vaisiai labai skanūs, tinkami pervežti. Augalai atsparūs daugeliui ligų, todėl ilgai dera.	
NINJA F ₁	Stambūs	A	M, R	Ypač stipri šaknų sistema. Vaisiai 10–12 cm ilgio. Lapų pažastyse gali užsimegzti po 2–4 vaisius.	
ROMARA F ₁	Stambūs	A	M, R	Išaugina trumpus šoninius ūglius, puikiai dera net jei trūksta šviesos. Vaisiai viename mazge auga po 1–2.	
VENERA F ₁	Stambūs	A	M, R	Vaisiai su mažais spygliukais ir retais kauburėliais, traškūs, 10–12 cm ilgio, 80–90 g svorio.	
ZIZEL F ₁	Stambūs	A	M, R	Augalai labai ilgai dera. Vaisių viename mazge auga po 2–3, nepaprastai saldūs ir skanūs.	
Ilgavaisių agurkų hibridinės (F ₁) veislės					
BURPLESS TASTY GREEN F ₁	Stambūs	A	–	Vaisiai 20–24 cm ilgio, su retais stambiais kauburėliais.	
GREEN EVOLUTION F ₁	Stambūs	A	–	Augalai užaugina labai gausų derlių. Vaisiai 25–27 cm ilgio, apie 4 cm skersmens, su retais stambiais kauburėliais.	
NIKIFOR F ₁	–	A	–	Augalai išaugina mažai šoninių ūglių, bet duoda gausų derlių. Vaisiai 20–23 cm ilgio, auga po 1–2, labai saldūs ir skanūs.	
SALADIN F ₁	–	VA	–	Vaisiai lygia odele, 30–35 cm ilgio.	
Lauko agurkų hibridinės (F ₁) veislės					
CROSS COUNTRY F ₁	Stambūs	VA	M, R	Augalai labai atsparūs ligoms. Vaisiai smulkūs, vienodi, skanūs.	
EDYP F ₁	Stambūs	VA	M, R	Augalai išsiskiria ilgu vegetacijos periodu. Vaisiai nelinkę storėti, labai skanūs, traškūs. Tinka auginti ekologiniuose ūkiuose.	
EDMAR F ₁	Stambūs	VA	M, R	Partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti lauke. Vaisiai apie 12 cm ilgio, su stambiais kauburėliais, neapkarsta. Odelė su trumpomis šviesiomis juostelėmis.	
REGAL F ₁	Stambūs	VA	M, R	Puikiai dera nepalankią vasarą.	
SONATE F ₁	Stambūs	VA	M, R	Augalai ilgai dera, atsparūs ligoms. Vaisiai šviesiai žali, tvirti.	

POSKIEPIAI


PROTECTOR F₁	- Specialus pomidorų hibridas, sukurtas pomidorams ir baklažanams skiepyti. - Skiepyti augalai išaugina mažiau lapų, bet ženkliai daugiau vaisių. - Paskiepyti augalai geriau ištveria temperatūrų svyravimus. - Galinga šaknų sistema (tris kartus didesnė nei įprasta) puikiai aprūpina drėgme ir maistinėmis medžiagomis. - Augalams reikia mažiau trąšų. - Padidėja atsparumas ligoms. - Geriau auga esant silpnesniai apšvietimui, ilgiau dera. - Pagerėja vaisių kokybė ir bendras derlius. - Daug ilgesnį laiką ištveria vandens trūkumą.	Poskiepio atsparumai ligoms: F2 – fuzariozei (greitajam vytuliui) 0, 1, 2 rasėms; Fr – fuzariniam šaknų puvinii; V – verticiliozei (lėtajam vytuliui); Tm – pomidorų mozaikos virusui; N – nematodams; Pl – šaknų kamštligei.	
COBOLT F₁	- Moliūgų hibridas, specialiai sukurtas agurkams, arbūzams ir melionams skiepyti. - Poskiepis išaugina galingą šaknų sistemą, kuri puikiai aprūpina augalą maisto medžiagomis ir vandeniu. - Skiepyti augalai ilgiau ištveria sausras. - Subrandina gausesnį bendrą derlių. - Labiau atsparūs pošaknio ligoms. - Pailgėja vegetacija, pradeda ankščiau derėti.	Poskiepio atsparumai ligoms: Fom – melionų fuzariniam vytuliui; For – agurkų fuzariniam vytuliui; Fon – arbūzų fuzariniam vytuliui; Va – verticiliozei.	
BEDROCK F₁	- Skiepyti augalai geriau ištveria nepalankias aplinkos sąlygas. - Pradeda daug ankščiau derėti. - Įskiepytos jautresnės veislės įgyja atsparumą dirvožemio patogenams. - Pailgėja augalų vegetacija. - Subrandina gausesnį bendrą derlių.	Poskiepio atsparumai ligoms: Tm – pomidorų mozaikos virusui; N – nematodams; TSWV – dėmėtajam lapų vytuliui; Pc – marui; PVY – bulvių virusui Y.	

BAKLAŽANAI, CUKINIJOS, MELIONAI

BAKLAŽANŲ hibridinės (F₁) veislės



Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Kitos savybės
BONICA F ₁	A	Augalai 55–60 cm aukščio. Vaisiai ovalo formos, tamsiai violetiniai, blizgūs, 250–350 g svorio.
CLARA F ₁	VA	Vaisiai ovalūs, šiek tiek briaunuoti, apie 500 g svorio. Minkštimas mėsingas, subtilaus skonio, kokybiškas.
KAZIMIR F ₁	LA	Augalai atsparūs ligoms, išaugina stiprią šaknų sistemą, itin gausiai dera. Vaisiai tamsiai violetiniai, cilindro formos, 21–23 cm ilgio, 250–300 g svorio.



CUKINIJŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Kitos savybės
CORA F ₁	LA	Vaisiai vertinami dėl puikios išvaizdos ir vidinės struktūros.
DIAMANT F ₁	A	Vaisiai cilindro formos, tamsiai žali. Augalai atsparūs miltligei, gerai pakelia temperatūrų svyravimus.
ELITE F ₁	LA	Itin derlingas hibridas. Vaisiai kokybiški, gražios prekinės išvaizdos.
EZRA F ₁	LA	Vaisiai šviesiai žali, skaniausi būna 15–20 cm ilgio. Augalai gerai ištvėria žemesnę temperatūrą, puikiai mezga vaisius.
LANKA F ₁	A	Hibridas atsparesnis puviniams nei kitos veislės. Vaisiai ilgi, puikios kokybės.



CUKINIJŲ hibridinės (F₁) veislės



Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Kitos savybės
ORELIA F ₁	A	Vaisiai geltoni, kokybiški, ilgai neperauga.
TARMINO F ₁	VA	Vaisių vidus tvirtas ir kietas. Nuimtas derlius ilgai nepraranda prekinės išvaizdos, tinka perdirbti ir šaldyti.
TERMINATOR F ₁	A	Vaisiai cilindriški, tamsiai žali, vidutinio ilgio arba ilgi.



MELIONŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Kitos savybės
MONICA F ₁	A	Geltonųjų melionų hibridas. Vaisiai ovalūs, geltona odele, tvirti, užauga iki 2,5 kg svorio. Minkštimas baltas, sultingas, labai skanus.
EMIR F ₁	A	Gerai pakelia žemesnę temperatūrą, todėl dera ir vėsesnę vasarą. Vaisiai ovaliai apvalūs, apie 1 kg svorio. Minkštimas oranžinis, 4–5 cm storio, kvapnus ir skanus.
CITIREX F ₁	LA	Hibridas augintinas šiltnamyje ir lauke. Augalai atsparūs ligoms. Vaisiai apvalūs, tvirti, užauga iki 2–2,5 kg svorio. Minkštimas baltas, sultingas, labai skanus.



ARBŪZAI, MOLIŪGAI



ARBŪZŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Vidutinis svoris, kg	Kitos savybės	
ASAHI MIYAKO F ₁	LA	7–8	Vaisiai apvalūs, dryžuota odele. Minkštimas raudonai rožinis, kokybiškas.	
CELINE F ₁	LA	8–10	Augalai gerai ištveria kintančias augimo sąlygas. Vaisiai apvalūs, dryžuota odele. Minkštimas tamsiai raudonas, traškus, nepaprastai skanus.	
KOGANE F ₁	A	8–10	Vaisiai apvalūs. Odelė šviesiai žalia su tamsiais dryžiais. Minkštimas ryškiai geltonas, itin saldus.	
LIVIA F ₁	A	8–12	Augalai greitai prisitaiko prie kintančių aplinkos sąlygų. Vaisiai ovalūs, dryžuoti. Minkštimas raudonas, traškus, labai saldus ir kvapus.	
ROSARIO F ₁	A	3–4	Hibridas pritaikytas auginti Vidurio Europos sąlygomis. Vaisiai apvalūs. Minkštimas tamsiai raudonas, skanus.	

MOLIŪGŲ hibridai ir veislės

Veislė	Ankstyvumas	Vidutinis svoris, kg	Kitos savybės	
AMAZONKA	A	1–1,5	Vaisiai plokščiai apvalūs, tamsiai oranžine odele ir oranžiniu minkštimu. Tinka sandėliuoti.	
ATLANTIC GIANT	V		Viena iš stambiausių moliūgų veislių. Vaisiai apvalūs, gali užaugti rekordiškai dideli.	
BIG MAX	V	Iki 50	Vaisiai ryškiai oranžinės spalvos, apvalūs.	
BUTTERFLY F ₁	V	2–3	Muskusinis (sviestinis) moliūgo hibridas. Vaisiai kriaušės formos, 30–35 cm ilgio, rusva odele ir oranžiniu minkštimu. Tinka šaldyti, nuimtą derlių laikyti 6–7 mėnesius.	



MOLIŪGŲ hibridai ir veislės

Veislė	Ankstyvumas	Vidutinis svoris, kg	Kitos savybės	
FUMIKO F ₁	A	1,5–1,7	Vaisiai plokščiai apvalūs, tamsiai žalia odele. Minkštimas storas, tamsiai geltonas, labai skanus. Tinka sandėliuoti.	
HOWDEN	VV	8–9	Vaisiai su storu ir standžiu oranžiniu minkštimu, puikiai tinka tiek maistui, tiek drožybai.	
JUSTYNKA F ₁	VV	2,5–3,5	Vaisiai plokščiai apvalūs. Minkštimas ryškiai oranžinis, iki 5 cm storio. Tinka laikyti per žiemą.	
KAROVITA BIS	VA	2,5–6	Vaisiai rutuliški, tinkami ilgai sandėliuoti.	
LONG OF NAPLES	V	10–20	Muskusinių moliūgų veislė, tinkama sandėliuoti. Vaisiai kriaušės formos, 50–60 cm ilgio.	
MARIMBA F ₁	A	1,8–2,2	Vaisiai plokščiai apvalūs, tamsiai žali su šlakeliais, puikiai išsilaiko iki vėlyvo pavasario. Minkštimas storas, geltonai oranžinis, tvirtas, saldus, turi pikantišką migdolų prieskonį, labai skanus.	
MUSCADE DE PROVENCE	V	2,5–8	Muskusinių moliūgų veislė. Vaisiai stipriai briaunoti, plokščiai apvalūs. Tinka ilgai laikyti.	
ROUGE VIF D'ETAMPES	A	4–8	Vaisiai ryškiai oranžiniai, plokščiai apvalūs, briaunoti. Tai viena iš skaniausių moliūgų veislių.	
UCHIKI KURI	VA	1–2,5	Vaisiai lašo formos, oranžine odele ir tamsiai oranžiniu minkštimu. Tinka ilgai sandėliuoti.	
WALTHAM BUTTERNUT	VA	1,5–2	Muskusinių moliūgų veislė. Vaisiai kriaušės formos, geltoni. Minkštimas oranžinis, labai kvapus ir skanus.	

MORKOS



MORKŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Ilgis (cm)	Kitos savybės	
CROFTON F ₁	V	18–20	Gera dera ir sunkesniuose dirvožemiuose. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu. Tinka ilgai sandėliuoti.	 ELLIS F ₁
ELLIS F ₁	V	18–22	Gera dera ir sunkesniuose dirvožemiuose. Vegetacijos laikotarpis 130 dienų. Šakniavaisiai buku galu, tvirti, tinkami ilgai laikyti. Lapija atspari miltligei, stipri, todėl derlių galima imti mechanizuotai.	
YMER F ₁	VV	18–20	Užauga per 120 dienų nuo sėklų sudygimo. Šakniavaisiai buku galu. Morkos ryškiai oranžinės, labai skanios, lygios, glotnia odele, tvirtos, todėl tinkamos plauti ir ilgai sandėliuoti.	
JERADA F ₁	LA	18–21	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Šakniavaisiai anksti įgauna ryškią spalvą, labai skanūs.	
MERCURIO F ₁	VA	18–20	Šakniavaisiai cilindriški, gali ilgai būti lauke. Tinka sandėliuoti.	 PATZI F ₁
MORELIA F ₁	VV	18–22	Hibridas labai atsparus grybinėms ligoms. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, tinkami perdirbti ir ilgai sandėliuoti.	
PATZI F ₁	VV	24–26	Itin derlingas hibridas. Šakniavaisiai Berlikum tipo, stambūs, cilindriški. Tinka ilgai sandėliuoti ir ypač perdirbti, sultims spausti.	 POLYDOR F ₁
POLYDOR F ₁	V	18–20	Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, tamsiai oranžiniai, skanūs. Tinka plauti ir ilgai sandėliuoti.	
SANTORIN F ₁	VV	18–20	Šakniavaisiai dailūs, cilindriški, tamsiai oranžiniai, lygia odele. Tinka plauti, ilgai laikyti.	 TRIBORD F ₁
THERA F ₁	VA	18–20	Šakniavaisiai cilindro formos, buku galu. Augdami neiškyla į paviršių, todėl nepažaliuoja ir ilgiau gali būti lauke. Tinka sandėliuoti.	
TRIBORD F ₁	VA	16–18	Šakniavaisiai cilindriški, traškūs ir skanūs. Morkos išauga tiesios ir lygios, sultingos. Tinka mažoms morkytėms gaminti, sandėliuoti iki kovo mėnesio.	
TITO	A	18–21	Nanto tipo veislė. Šakniavaisiai cilindriški, puikiai dera ir sunkesniuose dirvožemiuose. Tinka plauti, sandėliuoti.	

GŪŽINIAI KOPŪSTAI



GŪŽINIŲ KOPŪSTŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Vidutinis gūžių svoris (kg)	Kitos savybės	
ANCOMA F ₁	130–140	2–4,5	Hibridas atsparus šaknų ligoms. Gūžės šiek tiek plokščios. Tinka balandėliams gaminti, raugti, sandėliuoti.	 BRIGADIER F ₁
BURTON F ₁	Apie 120	3–8	Gūžės šiek tiek plokščios, plonais lapais ir trumpu vidiniu kotu. Tinka perdirbti, trumpai sandėliuoti. Dėl didelio cukraus kiekio ypač skanūs rauginti.	
BRIGADIER F ₁	120–130	4–6	Gūžės plokščiai apvalios, lauke ilgai netrūkinėja. Dėl gero skonio, didelio cukraus ir vitaminų kiekio labai tinka raugti.	 CONSTABLE F ₁
BRAVO F ₁	80–85	4,5–5	Puikus hibridas vasaros pabaigos ir rudens derliui. Gūžės plokščiai apvalios, ilgai netrūkinėja. Tinka raugti ir trumpai laikyti.	
CALLAWAY F ₁	80	2–3	Gūžės standžios, labai plokščios, apie 12–15 cm aukščio ir 30 cm pločio. Lapai traškūs, skanūs. Gūžės tinka raugti nepjaustytas.	 DUTCHMAN F ₁
CONSTABLE F ₁	53–60	1,5–2,2	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis ankstyvam derliui gauti. Gūžės kokybiškos, gali ilgiau būti lauke.	
DUTCHMAN F ₁	70–75	Apie 1,5	Hibridas augintinas visą sezoną. Gūžės siauro kūgio formos, standžios. Lapai ploni, labai skanūs. Tinka sandėliuoti 2–3 mėnesius.	 ROZERA F ₁
MAGNUS CRESCO F ₁	53–58	1,5–1,8	Tinka auginti po priedangomis ir lauke ankstyvam derliui gauti. Net jauni augalai puikiai pakelia nepalankias ir besikeičiančias aplinkos sąlygas. Gūžės rutuliškos, auga ant aukštų kotų, todėl mažiau serga puviniais.	
NEWTON F ₁	115–125	5–8	Gūžės plokščiai apvalios, standžios. Lapai ploni, balti. Tinkami raugti ir salotoms gaminti.	
MODERAT F ₁	115–125	2–2,5	Gūžės standžiai susisukusios, neišvirsta, netrūkinėja net ir ilgiau stovėdamos lauke. Tinka raugti.	
ROZERA F ₁	Apie 130	2–3	Raudongūžių kopūstų hibridas. Lapai padengti storu vaškiniu sluoksniu. Gūžės ovalios. Tinka ilgai sandėliuoti ir raugti.	
ZULEIMA F ₁	90–130	3–6	Gūžės plokščiai apvalios. Lapai ploni, lengvai atsiskiria. Puikiai tinka raugti ir salotoms gaminti.	

ŽIEDINIAI KOPŪSTAI, BROKOLIAI



ŽIEDINIŲ KOPŪSTŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Kitos savybės	
ARDENT F ₁	75–80	Žiedynai labai balti, tankūs, 1,5–2,5 kg svorio, subtilaus skonio, itin gerai apgaubti lapų, tinkami šaldyti.	 ARDENT F ₁
FERRARA F ₁	Apie 75	Augalų šaknų sistema stipri, todėl geriau pakelia karščius. Žiedynai labai gerai apgaubti lapų, tinkami šaldyti.	
ESCALE F ₁	90–100	Žiedynai sunkūs, tankūs, gerai uždengti lapų.	
NAUTILUS F ₁	65–75	Žiedynai stambūs, balti, gerai uždengti lapų, gražios prekinės išvaizdos.	 FERRARA F ₁
OPAAL F ₁	60–70	Veislė augintina šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke. Žiedynai tankūs, ryškiai balti, apie 1 kg svorio, gerai uždengti lapų, vienodi, susiformuoja vienu metu.	
SIGURD F ₁	60–90	Augalai gerai ištveria karščius, todėl tinkami auginti ir karštomis vasaromis. Greičiausiai derlių duoda vasaros pradžioje pasodinti daigai. Žiedynai itin balti, vienodi, tankūs ir sunkūs. Labai gerai apgaubti lapų, matomi tampa tik prieš pat nuimant derlių. Lapai nėra trapūs, todėl nuimant derlių mažai lūžta. Tinka vartoti šviežius ir šaldyti.	
SUNSET F ₁	Apie 70	Originalus hibridas, išauginantis ryškiai oranžinės spalvos žiedynus rudens derliui. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.	 SIGURD F ₁

BROKOLIŲ hibridinės (F₁) veislės

Hibridinė veislė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Kitos savybės	
APOLENA F ₁	75–85	Lauke hibridas augintinas nuo pavasario iki rudens, šiltnamiuose – visus metus. Žiedynai sveria apie 1 kg. Tinkami trumpai sandėliuoti.	 FIRST LAP F ₁
BABILON F ₁	65–70	Žiedynai sodriai žali, tankūs. Augalai išlieka sveiki net po ilgų ir stiprių liūčių.	
FIRST LAP F ₁	50–56	Vienas iš ankstyviausių hibridų. Žiedynai labai gražūs ir kokybiški. Smulkūs žiedpumpuriai sudaro kupolo formos žiedynus, kurių svoris 0,5–0,6 kg. Idealiai tinka labai ankstyvam derliui gauti.	
STROMBOLI F ₁	65–70	Hibridas augintinas po priedangomis ir lauke. Žiedynai tamsiai žali, sudaryti iš smulkių žiedpumpurių, labai kokybiški.	

KITOS KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

KITŲ KOPŪSTINIŲ DARŽOVIŲ hibridai ir veislės

Veislė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Kitos savybės		
Savojiniai kopūstai				
ENTIRA F ₁	75–80	Hibridas skirtas auginti lauke ir po priedangomis. Gūžės nedidelės, gerai apgaubtos lapų. Tinka salotoms, sriuboms ir balandėliams gaminti.	 ENTIRA F ₁	
VERTUS 2	80–90	Gūžės plokščiai apvalios, 2–4 kg svorio, tinka sandėliuoti iki 4 mėnesių. Tinka salotoms, sriuboms ir balandėliams gaminti.		
Garbiniuotieji kopūstai				
KADET	VA	Augalai 60–80 cm aukščio, pakenčia šaltį iki -15 °C, todėl gali žiemoti lauke. Lapai žali, garbanoti, vertingi savo dietinėmis savybėmis. Derlių galima imti iki pavasario.	 KADET	
SCARLET	VA	Labai atspari šalčiams veislė. Augalai 80–120 cm aukščio, pakenčia šaltį iki -18 °C. Lapai garbanoti, žali su violetiniu atspalviu, po pirmų šalčių įgaunantys melsvai violetinę spalvą. Derlių galima imti iki pavasario.		
WESTLANDESE	A	Augalai užauga iki 40–60 cm aukščio. Lapai melsvai žali, mėsingi, stipriai garbanoti, minkšti, todėl tinka ne tik karšties patiekalams, bet ir salotoms, kopūstų čipsams gaminti.	 BLANKYT	
Ropiniai kopūstai				
BLANKYT	A	Veislė augintina visą sezoną lauke. Stiebagumbiai (ropelės) stambūs, violetine odele ir balkšvu minkštimu, užauga per 50–55 dienas nuo daigų pasodinimo. Tinka šaldyti ir trumpai laikyti.		
EDER F ₁	A	Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Stiebagumbiai plokščiai apvalūs, iki 400 g svorio, tinka perdirbti. Vidus kremiškai baltas, kokybiškas. Lapai statūs, todėl lengva imti derlių.		
LUNA		Labai ankstyva čekiška veislė, augintina visą sezoną lauke. Stiebagumbiai apvalūs, šviesiai žali, minkštimas baltas. Užauga per 40–45 dienas nuo daigų pasodinimo.	 EDER F ₁	

		
KITŲ KOPŪSTINIŲ DARŽOVIŲ hibridai ir veislės		
Veislė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Kitos savybės
Briuseliniai kopūstai		
DOLORES F ₁	120–130	Augalai 100–110 cm aukščio, neišvirsta. Gūželės didelės, standžios, vienodo dydžio, užauga vienu metu, todėl derlių galima imti mechanizuotai. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.
Kininiai bastučiai		
BILKO F ₁	70	Vidutiniškai vėlyvas hibridas. Gūžės cilindriškos, 1,2–1,6 kg svorio, standžiai susisukusios, traškos ir skanios. Tinka ilgai sandėliuoti.
CAPITOL F ₁	58–65	Hibridas sėtinas pavasarį ir pirmoje liepos pusėje. Gūžės didelės, 1,5–2 kg svorio, elipsiškos, žalsvos, gerai apgaubtos lapų.
Kininiai kopūstai		
PAKET	45–55	Anksti pavasarį veislė augintina šiltnamyje, o lauke – visą sezoną. Maistui vartojami lapai su plačiu sultingu lapkočiu. Tinka trumpai laikyti.
Japoniniai kopūstai		
RED MIZUNA		Augalai nereiklūs, greitai auga. Aštrokas mizunos lapų skonis suteikia salotoms ir troškiniams pikantiškumo. Lapai gali būti pjaunami keletą kartų per sezoną.

BUROKĖLIAI		
BUROKĖLIŲ hibridai ir veislės		
Veislė	Kitos savybės	
BIKORES	Vidutiniškai ankstyva veislė. Šakniavaisiai apvalūs, tamsiai raudoni, su plona tvirta odele, maža skrotele ir plona šaknele. Tinka ankstyvam derliui gauti, sandėliuoti, perdirbti.	 KOSAK
BONA	Vidutiniškai vėlyva veislė. Užauga per 120 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisių odelė lygi, minkštimas sodrios spalvos, be šviesesnių koncentrinčių žiedų, saldus. Tinka perdirbti ir sandėliuoti per žiemą.	
BULL'S BLOOD	Labai ankstyva veislė, skirta lapams ir lapkočiams auginti. Augalai užauga per 40–45 dienas nuo sudygimo. Lapai ir lapkočiai gražūs, tamsiai raudoni.	
CHIOGIA	Labai ankstyva itališka veislė. Šakniavaisiai apvalūs, vidus ryškiai raudonas su plačiais baltais žiedais. Ši veislė pasižymi dietinėmis savybėmis.	 MONTY F ₁
CYLINDRA	Ankstyva veislė. Šakniavaisiai pailgi, 15–20 cm ilgio, apie 6 cm skersmens, plona odele, tamsiai raudonu vidumi. Tinka auginti ankstyvam derliui gauti, perdirbti, laikyti per žiemą.	
D'EGYPTE	Labai ankstyva veislė. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, plokščiai apvalūs. Vidus raudonas, su nežymiais žiedais. Tinka ankstyvam derliui gauti, laikyti per žiemą.	
DETROIT DARK RED 2	Ankstyva veislė. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, apvalūs, tamsiai raudonu vidumi, švelnaus, kiek saldoko skonio. Tinka, konservuoti, gaminti sultis ir laikyti per žiemą.	 SNIEŽNA KULA
GOLDEN EYE	Vidutiniškai ankstyva veislė. Šakniavaisiai oranžiškai geltoni, apvalūs, saldūs ir skanūs. Vartojami kaip ir raudonieji šakniavaisiai. Jaunus lapus galima vartoti kaip špinatus.	
KOSAK	Vidutiniškai vėlyva veislė. Šakniavaisiai labai gražūs, vidutinio dydžio, vienodi, cilindro formos, tamsiai raudoni, lygia odele, blizgūs. Tinka perdirbti ir ilgai sandėliuoti.	
MONTY F ₁	Ankstyvas hibridas, labai atsparus grybinėms ligoms, užauga per 100–110 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai apvalūs, tamsiai raudoni, labai kokybiški. Tinka ilgai sandėliuoti. Tai viena iš geriausių veislių, skirtų perdirbti.	 ZEPP0 F ₁
OPOLSKI	Užauga per 110–115 dienų nuo sėjos. Šakniavaisiai cilindro formos. Minkštimas tamsiai raudonas. Tinka laikyti per žiemą, konservuoti, ypač supjaustytus griežinėliais.	
PABLO F ₁	Vidutiniškai ankstyvas hibridas. Tinka sėti ir ankstyvam derliui gauti. Šakniavaisiai apvalūs, su maža skrotele, plona šaknele ir lygia odele. Vidus tamsiai raudonas, be šviesesnių žiedų, sultingas. Tinka ilgai laikyti.	
SNIEŽNA KULA	Ankstyva veislė. Šakniavaisiai balti, apvalūs, lygia odele. Minkštimas labai skanus, turtingas sausųjų medžiagų ir cukraus. Tinka konservuoti, šaldyti, troškinti ir baltiems barščiams virti.	 GOLDEN EYE
ZEPP0 F ₁	Vienas iš ankstyviausių hibridų, augintinų po priedangomis ir lauke. Užauga per 85–90 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele, plona šaknele, tamsiai raudoni. Tinka sėti pavasarį ir vasarą, sandėliuoti per žiemą.	

RIDIKĖLIAI, RIDIKAI



RIDIKĖLIŲ hibridai ir veislės

Veislė	Ankstyvumas	Forma	Kitos savybės
BELSAY F ₁	VA		Lauke augintinas hibridas. Šakniavaisiai ryškiai raudoni, užauga vienodo dydžio, dideli, su plona šaknele. Nuimtas derlius ilgai nepraranda prekinės išvaizdos, puikios vidinės kokybės, šakniavaisiai išlieka traškūs ir skanūs.
CELESTA F ₁	LA		Hibridas augintinas šiltnamyje visus metus, lauke – pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai raudoni, ilgiau laikant nepraranda kokybės.
DIABLUS F ₁	LA		Hibridas augintinas šiltnamiuose ir lauke nuo pavasario iki rudens. Priklausomai nuo oro sąlygų užauga per 4–8 savaites nuo sudygimo. Šakniavaisiai 4–5 cm ilgio, kokybiški, raudoni su baltu galiuku, išvaizdūs ir skanūs.
FLORELLA F ₁	A		Hibridas sukurtas visus metus auginti šiltnamiuose. Sezono metu puikiai dera ir lauke. Šakniavaisiai dideli, labai greitai užauga, ilgai nepraranda prekinės išvaizdos ir skonio.
MELITO F ₁	A		Hibridinė veislė, augintina lauke nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Šakniavaisiai stambūs, puikios prekinės išvaizdos.
PURPELLA F ₁	A		Hibridas ištisus metus augintinas šiltnamiuose ir sezono metu lauke. Šakniavaisiai violetine odele ir baltu vidumi. Ridikėliai sparčiai auga, puikios išvaizdos ir vidinės struktūros, nelinkę trūkinėti, ilgai nesužydi.
RONDEEL	VA		Veislė sėtina lauke visą sezoną. Šakniavaisiai apvalūs, 5 cm skersmens ir stambesni, tamsiai raudoni, ilgai neišpursta.
SOLARIS F ₁	LA		Hibridas augintinas visą sezoną šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke. Šakniavaisiai užauga stambūs, plona šaknele, ryškiai raudoni, kokybiški.
VIENNA F ₁	LA		Hibridas tinkamas auginti šiltnamyje ir lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai stambūs, apvalūs ar ovaliai apvalūs, užauga vienodi ir kokybiški.



RIDIKŲ hibridai ir veislės

Veislė	Kitos savybės
AGATA	Veislė sėtina nuo pavasario iki rudens. Užauga per 50–65 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai 17–25 cm ilgio, apie 200 g svorio, ilgiau laikant nepraranda kokybės. Minkštimas baltas, sultingas, skanesnis nei japoniškų ridikų.
ALABASTER F ₁	Hibridas sėtinas pavasarį ir vasarą. Užauga per 75–85 d. nuo sėjos. Šakniavaisiai ilgi, 40–45 cm ilgio, cilindro formos, balta odele. Viršutinė šakniavaisių dalis nepažaliuoja. Minkštimas baltas, švelnaus skonio. Tinka trumpai laikyti.
MINO EARLY	Vasarinė veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. Išauga per 55–60 dienų nuo sėjos. Šakniavaisiai ilgi, apie 40–50 cm, ištempto cilindro formos, balta odele. Minkštimas baltas, švelnaus skonio, sultingas. Tinka trumpai sandėliuoti.
RUNDER SCHWARZER WINTER	Vėlyva veislė, sėtina liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje. Užauga per 50–55 dienas nuo sudygimo. Šakniavaisiai apvaliai ovalūs, juoda šiurkštoka odele ir aštraus skonio baltu vidumi. Tinka laikyti per žiemą.



DARŽO ŽIRNIŲ veislės	
Veislė	Aprašymas
Raukšlėtieji žirniai	
AMBASADOR	Ankstyva veislė. Augalai 75–80 cm aukščio, išsiskiria atsparumu miltligei, todėl tinka vėlyvesnei sėjai. Ankštyse subręsta po 8–9 vidutinio dydžio žirnelius. Jų skonis įvertintas penkiais balais iš penkių galimų. Tinka konservuoti, šaldyti, virti.
ALEXANDRA	Ankstyva veislė, pakanti miltligei ir kitoms ligoms. Derėti pradeda po 65–70 dienų nuo sudygimo. Augalai 60–70 cm aukščio. Ankštys 10–11 cm ilgio. Jose subręsta po 8–9 labai skanias sėklas.
AVOLA	Labai ankstyva veislė. Vartojimui subręsta per 55–60 dienų nuo sudygimo. Augalai užauga iki 60 cm aukščio. Ankštyse subręsta po 6–8 labai skanias sėklas. Žirnelius tinka vartoti šviežius ir šaldyti.
GLORIOSA	Ankstyva veislė. Augalai 65–75 cm aukščio. Ankštys ilgos, jose subręsta po 7–8 stambius žirnelius. Tinka vartoti šviežius, šaldyti, konservuoti.
GREEN PEA	Veislė skirta sėkloms daiginti ir mikrožalumynams auginti. Daigintos sėklos tinka salotoms, sriuboms, troškiniams, vegetariškiems kotletams gaminti, garnyrams ir kitiems patiekalams ruošti.
JOHAN	Vidutiniškai ankstyva veislė, atspari daugeliui ligų. Ankštys ilgos ir tiesios. Jose subręsta po 8–10 didelių žirnelius. Derlių galima imti mechanizuotai. Tinka vartoti šviežius, konservuoti ir šaldyti.
KELWEDON WONDER	Ankstyva veislė. Užauga per 68–72 dienas nuo sudygimo. Augalai žemi, 45–65 cm aukščio. Žirneliai stambūs, tinkami virti, konservuoti ir šaldyti.
MEDUZA	Vidutiniškai ankstyva veislė. Puikiai dera net nepalankiomis augimo sąlygomis. Augalai išaugina daugiau ūsų nei lapų, jais susikabina, todėl nereikia atramų. Ankštyse subręsta labai skanūs žirneliai, kurie tinkami konservuoti ir ypač šaldyti.



DARŽO ŽIRNIŲ veislės	
Veislė	Aprašymas
OSKAR	Labai ankstyva veislė, vartojimui subręsta per 68 dienas. Augalai 70–80 cm aukščio, išsiskiria gausiu žalių žirnelių derliumi. Ankštys apie 9 cm ilgio, jose subręsta po 10–12 stambių žirnelių. Tinka vartoti šviežius, konservuoti ir šaldyti.
PICCIOTTO	Vidutiniškai ankstyva veislė. Augalai užauga iki 100–120 cm aukščio. Ankštys didelės, 9–10 cm ilgio. Jose subręsta maždaug po 10–11 saldžių žirnelių. Tinka šaldyti, vartoti šviežius ir įvairiems patiekalams gaminti.
PREMIUM	Viena iš ankstyviausių veislių. Žirnelius tinka vartoti šviežius ir konservuoti. Augalai neaukšti, 60–65 cm, derėti pradeda po 58–60 dienų nuo sėjos. Ankštyse subręsta po 7–8 dideles sėklas.
PROGRESS N. 9	Vidutiniškai vėlyva veislė, derėti pradeda po 62–67 dienų nuo sudygimo. Augalai žemi, 50–55 cm aukščio. Ankštys labai didelės, apie 10 cm ilgio, jose subręsta po 8–9 sėklas.
RONDO	Vidutiniškai ankstyva veislė. Augalai užauga iki 80–100 cm aukščio. Lapų pažastyse užsimezga po 1–2 ankštis, kurios skinamos maždaug po 75 dienų nuo sėjos. Ankštys 11–12 cm ilgio. Jose subręsta maždaug po 10 labai saldžių žirnelių. Juos tinka šaldyti.
TELEFON	Vėlyva veislė. Augalai aukšti, 1,5–2,5 m. Jiems reikalingos atramos. Derėti pradeda po 100–110 dienų nuo sėjos. Dera ilgai ir gausiai. Ankštys stambios, 10–11 cm ilgio.
Cukriniai žirniai	
AMBROSIA	Vidutiniškai ankstyva veislė. Vartojimui subręsta per 65 dienas nuo sudygimo. Augalai išauga 70–75 cm aukščio. Jaunos ankštys be pergamentinio sluoksnio, todėl jas galima vartoti kartu su saldžiomis sėklomis.
CAROUBY	Vidutiniškai ankstyva veislė. Vartojimui subręsta per 65 dienas nuo sudygimo. Augalai išauga 70–75 cm aukščio. Žydi violetiniais žiedais. Jaunos ankštys be pergamentinio sluoksnio, todėl jas galima vartoti kartu su saldžiomis sėklomis. Tinka šaldyti ir konservuoti. Sunokusios sėklos pilkšvos spalvos.



PUPELĖS, PUPOS



PUPELIŲ veislės		
Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
Žemaūgės daržinės pupelės		
BERGGOLD	VA	Augalai apie 45 cm aukščio, derėti pradeda po 60–65 dienų nuo sudygimo. Ankštys geltonos, apie 13 cm ilgio ir 0,9 cm pločio, skanios. Sėklos baltos, pailgos.
BRITTLE WAX	VV	Augalai 30–45 cm aukščio. Ankštys geltonos, iki 15 cm ilgio, apvalaus skerspjuvio, mėsingos, be plaušelių. Tinka šaldyti ir marinuoti. Sėklos baltos su rudu „pilveliu“.
FURORE	LA	Veislė sėtina nuo gegužės iki liepos mėnesio. Augalai 45–50 cm aukščio, užaugina puikų derlių. Ankštys 0,8–0,9 cm skersmens ir 14–15 cm ilgio, be plaušelių, išsidėsčiusios augalo viršutinėje dalyje, todėl derlių galima imti mechanizuotai. Sėklos baltos.
GOLDMARIE	A	Veislė labai pakanti nepalankioms oro sąlygoms. Dera labai ilgai. Užauga iki 2,5 m aukščio ir daugiau, todėl joms reikalingos atramos. Tinka tvoroms, pavėsinėms ir kitiems statiniams apželdinti. Ankštys geltonos, plokščios, apie 20 cm ilgio ir 2,5 cm pločio, be plaušelių, mėsingos.
HARVESTER	A	Veislė derėti pradeda po 60–65 dienų nuo sudygimo. Ankštys žalios, be plaušelių, lygios, 12–13 cm ilgio, išsidėsčiusios viršutinėje ir vidurinėje stiebo dalyje. Tinka vartoti šviežias, marinuoti, šaldyti.
MAXIDOR	A	Augalai vidutinio aukščio. Jiems nereikia atramų. Ankštys be plaušelių, šviesiai geltonos, 14–16 cm ilgio, labai skanios. Tinka konservuoti, šaldyti ir vartoti šviežias. Sėklos ovalios, baltos.
SONESTA	A	Veislė derėti pradeda po 60–70 dienų nuo sėklų sudygimo. Augalai 45–50 cm aukščio, labai gausiai dera. Ankštys aukso geltonumo, 12–13 cm ilgio, be plaušelių, mėsingos. Tinka marinuoti ir šaldyti. Sėklos pailgos, baltos.
TARA	VV	Augalai vidutinio aukščio. Laikas nuo sėjos iki derliaus nuėmimo 76 dienos. Ankštys aukso geltonumo, be plaušelių, 12–14 cm ilgio, išsidėsčiusios viršutinėje augalo dalyje, subręsta vienu metu, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Tinka konservuoti ir šaldyti. Sėklos pailgos, baltos.
PURPLE QUEEN	A	Ankstyva veislė. Augalai neaukšti. Vartojimui subręsta per 53–55 dienas nuo sudygimo. Ankštys apie 15 cm ilgio, violetinės, verdant pažaliuoja, labai skanios. Tinka konservuoti ir šaldyti.



FURORE



GOLDMARIE



SONESTA



TARA



PUPELIŲ veislės		
Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
Gliudomos pupelės		
BORLOTTO LINGUA DI FUOSO NANO	VA	Augalai žemi, derėti pradeda po 66–70 dienų nuo sėjos. Ankštys ilgos, jose subręsta po 7 kreminės spalvos sėklas su raudonais dryželiais.
IGOLOMSKA	VA	Augalai auga neaukšti, todėl nereikia atramų. Sėklos stambios, baltos. Vienam arui apsėti reikia 900–1000 g pupelių, o derlius siekia apie 30 kg. Maistui vartojamos subrendusios sėklos.
WAWELSKA	A	Augalai neaukšti. Ankštys auga krūmo išorėje. Sėklos didelės, raudonai rudos, lygia blizge odele. Tinka konservuoti.

PUPŲ veislės		
Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
Daržo pupos		
WHITE WINDSOR	VA	Veislė derėti pradeda po 90–100 dienų. Ankštys apie 15 cm ilgio. Jose vienu metu subręsta 3–4 žalsvai baltos ovalios sėklos. Tinka perdirbti.
EXTRA PRECOCE A GRANO VIOLETTO	LA	Augalai užauga 80–90 cm aukščio. Ankštys 23–25 cm ilgio. Jose subręsta po 6–7 sėklas. Šviežios sėklos žalios, džiūdamos įgyja violetiškai rudą spalvą.
SUPERAGUADULCE	VA	Augalai užauga 80–90 cm aukščio. Ankštys stambios, 23–25 cm ilgio. Kiekvienoje ankštyje subręsta po 7–8 didelės sėklas, kurių mažiausias dydis siekia 14 mm.



IGOLOMSKA



SUPERAGUADULCE

SALIERAI, KUKURŪZAI



VALGOMŲJŲ SALIERŲ hibridai ir veislės

Veislė	Vegetacija (dienos nuo daigų pasodinimo)	Aprašymas
Šakniavaisiniai salierai		
ALBIN	120–140	Šakniavaisiai apvalūs, dideli, be ertmių. Minkštimas labai baltas. Tinka perdirbti ir sandėliuoti.
ASTERIX F ₁	130	Jaunus gumbus galima nuimti ir po 90 dienų. Šakniavaisiai dideli, apvalūs. Šaknys auga tik apatinėje gumbo dalyje. Gumbas pradeda augti anksti, jau pirmose vystymosi fazėse. Augalai atsparūs ligoms, nelinkę žydėti. Tinka perdirbti, sandėliuoti.
GIANT PRAGUE	120–130	Šakniavaisiai dideli, apvalūs, baltu vidumi, švelnaus skonio. Tinkami laikyti per žiemą.
MONARCH	140–150	Atspari ligoms veislė. Šakniavaisiai 10–15 cm skersmens, 700–900 g svorio. Vidus baltas, aromatingas, skanus. Tinka perdirbti, laikyti per žiemą.
TORPEDO F ₁	130	Hibridas atsparus ligoms. Šakniavaisiai apvalūs, šaknys auga apatinėje dalyje, todėl juos lengviau rauti ir valyti, vidus baltas, be ertmių. Tinkami perdirbti ir ilgai sandėliuoti.



VALGOMŲJŲ SALIERŲ veislės

Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
Lapkotiniai salierai		
D'ELNE	80–100	Lapkočiai stambūs, mėsingi. Augalai 60–70 cm aukščio. Tinkami šaldyti.
LINO	80	Veislė augintina po priedangomis ir lauke. Augalai labai greitai auga. Lapkočiai statūs, šiek tiek briaunoti, mėsingi, ilgi. Lapai ryškiai žali, blizgūs. Tinka šaldyti.
Lapiniai salierai		
PIKANT	70–80	Veislė skirta lapams auginti. Lapai stipriai skaldyti, šiek tiek garbanoti. Vartojami švieži. Tinkami šaldyti ir džiovinti.



SALDŽIŲJŲ KUKURŪZŲ hibridai

Hibridinė veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
RAQUEL F ₁	72–75	Augalai gerai pakelia karščius, tvirti. Šaknų sistema stipri. Burbulės užauga vienodos, iki 20–22 cm ilgio ir 5,5–6 cm skersmens, labai gražios prekinės išvaizdos. Sėklos stambios, dviejų spalvų (geltonos ir baltos), itin saldžios. Tinka marinuoti ir šaldyti. Burbulės vartojamos pieninės brandos.
SENTINEL F ₁	76–78	Itin saldžių kukurūzų hibridas. Augalai atsparūs ligoms, užauga iki 2 m aukščio ir daugiau. Burbulės cilindro formos, 22–24 cm ilgio, labai saldžios.



PORAI, TUŠČIALAIŠKIAI ČESNAKAI

DARŽINIŲ PORŲ hibridai ir veislės

Veislė	Aprašymas	
ARMOR	Augalai užauga per 100–110 dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai melsvai žali, baltoji stiebo dalis 18–20 cm ilgio. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir ilgai laikyti.	
BULGINA	Akstyva veislė. Augalai per 110–130 dienų išaugina iki 60 cm ilgio lapkotinį stiebą. Derlių galima imti nuo ankstyvo rudens. Tinka džiovinti ir šaldyti. Sėklas galima sėti tiesiai į žemę.	
KAMPUS	Lapkotinis stiebas stambus, 20–23 cm ilgio, 200–220 g svorio, skanus. Augalai gerai žiemoja lauke.	
MERCURIAN F ₁	Vidutiniškai ankstyvas hibridas, augintinas rudens derliui. Netikro stiebo baltoji dalis 25–30 cm ilgio. Jo gale svogūnas nesusiformuoja. Lapai statūs, lankstūs, padengti storu vaškiniu sluoksniu.	
STAROZAGORSKI KAMUŠ	Veislė augintina vasaros ir rudens derliui. Užauga per 100–140 dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai šviesiai žali. Vartojamoji dalis (lapkotinis stiebas) 55–65 cm ilgio.	

TUŠČIALAIŠKIŲ ČESNAKŲ veislės

Veislė	Aprašymas	
BAJKAL	Ankstyva daugiamečių svogūnų veislė, augintina laiškams. Augalai auginami iš sėklų, ropučių neformuoja. Laiškai raunami su šaknimis ar pjaunami. Tinka sėti nuo ankstyvo pavasario iki liepos mėn. vidurio.	
ENTITA	Veislė skirta laiškams su ropelėmis auginti. Sėtina nuo pavasario iki liepos mėn. vidurio. Laiškai tamsiai žali, statūs. Sėjant pavasarį, vartojimui užauga per 70 dienų, vasarą – per 55 dienas.	
KAJ	Augalai užauga per 80 dienų nuo sudygimo, nežiemuoja. Laiškai sodriai žali, su storesniu vaškiniu sluoksniu, todėl atsparesni miltligei, statūs, gali siekti 70 cm. Baltas kaklelis apie 10–12 cm ilgio.	
KYOTO MARKET	Ankstyva japoniška veislė, puikiai auga esant tiek aukštai, tiek žemai temperatūrai. Laiškai ilgi, sodrios spalvos, gero skonio. Baltoji netikro stiebo dalis užauga 20–25 cm ilgio. Derlių galima imti visą sezoną.	

SĖJAMOSIOS SALOTOS, DARŽINIAI ŠPINATAI



LAPINIŲ SALOTŲ veislės

Veislė	Aprašymas	
AFICION	Lapinių salotų veislė, augintina šiltnamyje ir lauke. Pasižymi dideliu atsparumu ligoms, ilgai nesužydi. Lapai šviesiai žalios spalvos, smulkiai garbanotais kraštais. Patartina sodinti daigais.	
AMERIKANISCHER BRAUNER	Ankstyva lapinių salotų veislė. Užauga per 50–60 dienų nuo sėjos. Lapai traškūs, banguoti, rusvai žali, nupjauti greitai atželia.	
FRILLICE	Lapinių „ledo“ salotų veislė, turinti visas geriausias savybes – atsparios ligoms, traškos, labai skanios ir dekoratyvios. Patartina sodinti daigais.	
GENTILE	Lapinių salotų veislė, augintina lauke visą sezoną. Lapai didesni ir šiek tiek storesni nei kitų veislių, garbanoti, šviesiai žali. Augalai nupjauti greitai atželia, gerai pakelia karščius, ilgai nesužydi. Tinka sėti tiesiai į dirvą ar sodinti daigais.	
GRAND RAPIDS	Ankstyva lapinių salotų veislė. Augalai užauga per 40–50 dienų nuo sudygimo. Lapija vešli, kompaktiška, šviesiai žalia. Salotos skanios, greitai atželia.	
LOLLO BIONDA	Vidutiniškai ankstyva lapinių salotų veislė. Tinka auginti lauke visą sezoną. Augalai užauga per 45–50 dienų nuo sudygimo. Lapai šviesiai žali, trapūs, skanūs.	
LOLLO ROSSA	Ankstyva lapinių salotų veislė. Augalai užauga per 40–50 dienų nuo sudygimo. Lapų skrotelės vešlios, kompaktiškos, rausvai žalios.	

GŪŽINIŲ SALOTŲ veislės

Veislė	Aprašymas	
ATTRACTION	Vidutiniškai ankstyva gūžinių salotų veislė. Gūželės didelės, apvalios, šviesiai žalios. Augalai nelinkę sužydėti. Tinkami auginti pavasarį, vasarą ir rudenį. Patartina sodinti daigais.	
BRASILIANA	Vidutiniškai ankstyva gūžinių „ledo“ salotų veislė, augintina vasaros ir rudens derliui. Užauga per 80–90 dienų nuo sėjos, labai lengvai prisitaiko prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Gūžės vidutinio dydžio, apvalios, standžiai susisukusios. Patartina sodinti daigais.	
PANTER	Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 65–75 dienas nuo sėjos. Lauke augintina nuo pavasario iki rudens, šiltnamiuose visus metus. Augalai atsparūs netikrajai miltligei, ilgai nesužydi. Gūželės vidutinio dydžio, apvalios.	
GUSTINAS	Gūžinių „ledo“ salotų veislė, augintina lauke visą sezoną, šiltnamiuose ištisus metus, gerai pakencia atšiauresnes sąlygas. Gūžės apvalios, standžios, gerai uždengtos lapų, kurie apsaugo nuo saulės kaitros. Tinka perdirbti. Patartina sodinti daigais.	



GŪŽINIŲ SALOTŲ veislės

Veislė	Aprašymas	
DEREL	Gūžinių „ledo“ salotų veislė, augintina šiltnamiuose ir lauke. Gūželės nedidelės, labai skanios ir dekoratyvios, šviesiai žalios, išoriniai lapai ir vidinių lapų pakraščiai tamsiai raudoni.	
SALADIN	Vėlyva gūžinių (ledo) salotų veislė. Užauga per 75–85 dienas. Gūželės didelės, standžiai susisukusios, šviesiai žalios, traškos ir sultingos. Patartina sodinti daigais.	
SAULA	Gūžinės „ledo“ salotos, augintinos nuo pavasario iki vasaros pabaigos. Augalai gerai pakelia karščius, temperatūrų svyravimus, ilgai nesužydi. Gūžės didelės, plokščiai apvalios, tinka sandėliuoti.	

ROMANINIŲ SALOTŲ veislės

Veislė	Aprašymas	
COVENTRY	Smulkiųjų romaninių salotų veislė, šiltnamiuose augintina visus metus, lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Gūželės žalios, traškos, sultingos, labai saldžios. Patartina sodinti daigais.	
RIOS	Mažųjų romaninių salotų veislė, tinkama sėti visą sezoną. Gūželės standžiai susisukusios, traškos, sultingos, iki 15 cm ilgio. Nuėmus derlių ilgai nepraranda prekinės išvaizdos ir puikaus skonio.	
LITTLE GEM	Ankstyva mažų romaninių salotų veislė, tinkama auginti po priedangomis ir lauke visą sezoną. Gūželės mažos, sudarytos iš traškių, sultingų ir saldžių lapų. Patartina sodinti daigais.	
PARIS WHITE	Ankstyva romaninių salotų veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. Užauga per 90 dienų nuo sėjos. Gūželės pailgai ovalios, šviesiai žalios. Lapai traškūs, mėsingi ir sultingi.	

DARŽINIŲ ŠPINATŲ veislės		
Veislė	Aprašymas	
BOA F ₁	Hibridas sėtinas nuo pavasario iki rudens. Augalai ilgai nesužydi, todėl augintinas ir vasarą. Lapai ovalūs, mėsingi, tamsiai žali, auga ant trumpų lapkočių, tinkami perdirbti.	 GOANNA F ₁
EARLY HYBRID N.7	Vidutiniškai ankstyvas hibridas, sėtinas pavasarį ir vasaros pabaigoje. Lapai platūs, ruplėti. Patartina vartoti neperaugusius špinatų lapus, tada jie turi mažiau oksalatų, o skonis būna geresnis.	
GOANNA F ₁	Itin derlinga veislė, augintina visą sezoną. Augalai užauga per 25 dienas nuo sudygimo, atsparūs ligoms, ilgai nesužydi. Lapai nedideli, tamsiai žali, ovaliai apvalūs, stori, auga į viršų. Tinka perdirbti.	
MATADOR	Vidutiniškai ankstyva veislė, sėtina anksti pavasarį ir vasaros pabaigoje. Lapai dideli, ovalūs, nežymiai banguoti, tamsiai žali. Tinka šaldyti.	
PUMA F ₁	Atsparus ligoms hibridas. Lapai dideli, tvirti ir stori, išauga ant trumpų stiebų. Augalai nelinkę žydėti, todėl ypač tinka vasaros derliui gauti. Tinka perdirbti.	
RED TABBY F ₁	Vidutiniškai vėlyvas hibridas, augintinas visą sezoną. Lapai lygūs, ovalūs, tamsiai žali. Raudoni lapkočiai ir gyslos sudaro unikalų ir ryškų spalvų kontrastą su žaliais lapais.	 RED TABBY F ₁
ZELANDINIAI ŠPINOKAI	Augalai vėlyvesni už špinatus, užauga per 60 dienų nuo sudygimo. Augintini nuo ankstyvo pavasario iki rudens. Lapai smailūs, smulkesni ir storesni nei tikrųjų špinatų, nupjauti atželia. Tinka vartoti šviežius ir šaldyti.	

KRAPAI, PETRAŽOLĖS		
PAPRASTŲJŲ KRAPŲ veislės		
Veislė	Aprašymas	
COMMON	Populiari derlinga veislė. Augalai aromatingi, aukšti, nereiklūs. Maistui naudojami švieži ir džiovinti lapai, žiedynai, stiebai. Tinka šaldyti, konservuoti.	 COMMON
HANAK	Ankstyva veislė, augintina po priedangomis ir lauke. Lapai šviesiai žali, labai kvapūs. Tinka konservuoti.	
LENA	Žemaugė veislė. Lapai tamsiai žali, labai kvapūs. Augalai 25–30 cm aukščio, statūs, stipriai šakojasi, ilgai nesužydi. Tinka auginti vazonuose, lauke visą sezoną, šiltnamyje pavasario ir rudens derliui gauti.	
MAMMOTH	Žemaugė vidutiniškai ankstyva veislė, nelinkusi greitai žydėti. Augalai aromatingi, išaugina didelį žaliosios masės derlių, kurį galima skinti jau po 20 dienų nuo sėklų sudygimo.	 MONARCH
MONARCH	Žemaugė veislė. Užauga iki 70 cm aukščio, ilgai nesužydi. Lapija vešli, melsvai žalios spalvos.	
MORAVAN	Žemaugė veislė, augintina lauke ir po priedangomis. Augalai ilgai nesužydi, užaugina gausų žalumos derlių. Lapija vešli, melsvai žalios spalvos.	
OLIVER	Vidutiniškai ankstyva veislė, augintina lauke ir po priedangomis. Lapai tankūs, ryškiai žali.	 SARI
SARI	Ypatingai kvapi, atspari ligoms, nelinkusi greitai žydėti veislė. Gera auga esant silpniam apšvietimui, todėl labai tinka auginti šiltnamiuose, dėžutėse ant palangės rudenį, žiemą ir pavasarį.	
SUPERDUKAT	Žemaugė ankstyva veislė, užauginanti didelį lapų ir žiedynų derlių. Augalai kvapūs, turtingi eterinių aliejų, todėl tinka vartoti šviežius ir perdirbti.	

SĖJAMŲJŲ PETRAŽOLIŲ veislės	
Veislė	Aprašymas
ALBA	Vidutiniškai ankstyva šakninių petražolių veislė, atspari ligoms. Šakniavaisiai kvapūs, kūgio formos, 15–18 cm ilgio, nelinkę šakotis, lygia balta odele. Tinka perdirbti ir sandėliuoti per žiemą.
ASTRA	Augalų lapai garbanoti, aromatingi, nupjauti greitai atauga, todėl derlių galima imti kelis kartus per sezoną. Tinka vartoti šviežius, šaldyti ir džiovinti.
EFEZ	Vidutiniškai ankstyva šakninių petražolių veislė, atspari miltligei, rūdims ir puviniams. Šakniavaisiai lygūs, stori, užauga iki 20–23 cm ilgio. Tinka ilgai laikyti, perdirbti.
FEST	Augalai vidutinio aukščio, plačiai išsikerojantys, tankia lapija. Lapai lygūs, vienodi. Ankstyvam derliui gauti rekomenduotina sėti rudenį. Tinka vartoti šviežius, džiovinti ir šaldyti.
GIGANTE D'ITALIA	Vidutiniškai ankstyva veislė. Lapai lygūs, tamsiai žali, vešlūs. Augalai gerai pakenčia šalčius ir karščius.
LAURA	Augalų lapai tamsiai žali, lygūs, smulkiai karpyti. Lapkočiai tvirti, statūs. Derlių galima imti kelis kartus. Tinka auginti vazonėliuose.
MENUETTE	Augalai plačiai išsikerojantys, su tankia lapija, labai dekoratyvūs, kvapūs. Išsiskiria plunksniškai suskaldytais lapais, išvaizda panašiais į krapų. Tinka vartoti šviežius, džiovinti ir šaldyti. Veislė augintina lysvėse ir induose.
MOSS CURLED 2	Ankstyva veislė. Užauga per 70 dienų nuo sudygimo. Lapai gražūs, garbanoti, tamsiai žali. Augalai gerai pakenčia šalčius ir karščius.



PRIESKONINIAI AUGALAI		
PRIESKONINIŲ AUGALŲ rūšys		
Rūšis	Sėklų skaičius 1 g	Aprašymas
Vienmečiai augalai		
Vaistinės agurklės <i>Borago officinalis</i>	150	Jauni stiebai ir lapai yra agurkų skonio, todėl jais tinka gardinti salotas, šaltibarščius, varškę, įvairius gėrimus.
Kvapieji bazilikai <i>Ocimum basilicum</i>		Vienmečiai medingi prieskoniniai augalai, augintini daigais. Vartotina šviežia ir džiovinta žolė.
CINAMON		Lapai labai aromatingi, turi cinamono ir baziliko skonį.
GREEK COMPACT		Veislė žemaūgė, tinkama auginti vazonuose. Lapeliai maži. Keras sferiškas.
LEMON	700–800	Turi citrinos ir baziliko skonį.
LUXOR		Augalai labai atsparūs ligoms, kvapūs, pritaikyti auginti vazonuose, bet puikiai želia ir lysvėse.
FULVIO (PURPLE OPAL)		Augalai neaukšti, todėl tinka auginti ir vazonuose. Lapai dideli, raudonai violetiški.
TOSCANO		Veislė išsiskiria dideliais ruplėtais ir labai kvapiais lapais.
Daržiniai dašiai <i>Satureja hortensis</i> SATURN	2200	Vartotini švieži ir džiovinti dašių lapai bei stiebų jaunos viršūnėlės. Tai klasikiniai prieskoniai pupelių ir grybų patiekalams.
Peruvinės dumplūnės <i>Physalis peruviana</i>	1000	Augalai apie 40 cm aukščio. Lauke sodintini daigais. Vaisiai smulkūs, 4–5 g svorio, geltoni su oranžiniu atspalviu, saldžiarūgščiai, sunoksta apvalkalėlyje.
Sėjamosios gražgarstės <i>Eruca sativa</i>	400	Lapai aštroko pikantiško skonio, su riešutų prieskoniu. Subrendusios sėklos vartotinos kaip garstyčių grūdėliai.
Blakinės kalendros <i>Coriandrum sativum</i>	100	Prieskoniniai medingi augalai, išaugantys iki 80–100 cm aukščio. Maistui vartojamos sėklos, švieži ir džiovinti lapai.
Kvapieji mairūnai <i>Majorana hortensis</i>	12000–13000	Tinka auginti namie ant palangės, dėžutėse balkone ar terasoje, lysvėje. Vartotina šviežia ir džiovinta žolė.
Vaistinės ožragės <i>Trigonella foenum-graecum</i>	75	Augalai 20–50 cm aukščio. Maistui vartotinos sėklos, šviežia ir džiovinta žolė. Sėklos įeina į prieskonio „Karis“ sudėtį, pakepintos turi grybų skonį.
Sėjamosios pipirinės <i>Lepidium sativum</i> DANSKA	400–450	Augalai žiemą ir pavasarį augintini balkone ar ant palangės. Maistui vartotini pikantiško aštroko skonio jaunų augalų lapai. Sėklos tinkamos maistui papuošti ir pagardinti.
Vaistinės ramunės <i>Matricaria recutita</i>	16000	Vaistiniai 40 cm aukščio augalai. Vartotini išdžiovinti, visiškai išsiskleidę žiedynai. Iš jų ruošiami antpilai ir nuovirai.
Siūlalapiai serenčiai <i>Tagetes filifolia</i>	600–700	Visos augalo dalys aromatu ir skonių panašios į anyžių ar saldymedį. Lapai labai dekoratyvūs, plunksniškai suskaldyti, išvaizda panašūs į krapų. Tinka auginti vazonuose ir lysvėse.



PRIESKONINIŲ AUGALŲ rūšys			
Rūšis	Sėklų skaičius 1 g	Aprašymas	
Daugiamečiai augalai			
Lanksčiosios citrinžolės <i>Cymbopogon flexuosus</i>	2000	Augalai sezono metu augintini lauke, žiemai pernešami į patalpas. Lapai turi originalų ir malonų citrinų kvapą ir skonį. Juos galima nuolat skabyti ir vartoti šviežius, džiovinti, šaldyti.	
Vaistiniai čiobreliai <i>Thymus vulgaris</i>	5000	Malonaus kvapo ir kartoko skonio medingi augalai. Vartotina šviežia ir džiovinta žolė.	
Kalniniai dašiai <i>Satureja montana</i>	2000	20–40 cm aukščio puskrūmiai, žiemojantys su lapais. Augalai nereiklūs, atsparūs šalčiams. Prieskoniniams mišiniams gaminti naudojamos žydinčios dašių šakelės.	
Vaistinės juozažolės <i>Hyssopus officinalis</i>	1000	Žiedai, žali ir džiovinti lapai tinka patiekalams paskaninti, arbatoms ruošti. Juozažolių nektaro medus yra aukščiausios rūšies. Sėklos sėtinamos anksti pavasarį arba vėlai rudenį į lysves.	
Vaistinės gelsvės <i>Levisticum officinale</i>	260	Šviežių stiebų ir lapų aromatas šiek tiek panašus į salierų. Džiovinta žolė ir šakniastiebiai kvepia grybais.	
Paprastosios katžolės <i>Nepeta cataria</i>	1650	Vartotina šviežia ir džiovinta žolė, kuri renkama žydėjimo pradžioje. Kvapas ir skonis panašus į citrusinių vaisių.	
Kartieji kiekiai <i>Artemisia absinthium</i>	10000	Puikiai auga skurdžiuose dirvožemiuose, nereiklūs. Lapai pilkai žali, suskaldyti, dekoratyvūs. Vartotinos viršutinės stiebų dalys su žiedynais. Tai puikus prieskonis ir vertinga arbata namų vaistinėlei.	
Tikrosios levandos <i>Lavandula angustifolia</i>	900–1000	Dekoratyvūs augalai. Maistui vartotini žiedai ir lapai. Iš žiedų nektaro sunėštas medus priskiriamas pirmai rūšiai.	
Vaistinės melisos <i>Melissa officinalis</i>	2000	Augalai turi malonų, citrinas primenantį kvapą. Vartotina žalia ir džiovinta žolė.	
Garbiniuotosios mėtės (šaltmėtės) <i>Mentha spicata</i>	18000	Augalai užauga iki 60–80 cm aukščio. Lapai tamsiai žali, itin stipraus aromato ir skonio. Lapelius tinka skinti ir džiovinti iki sužydint augalams. Sėklos sėtinamos į daigyklas.	
Obuolinės mėtės <i>Mentha suaveolens</i>	17000	Augalų kvapas panašus į šaltmėčių ir vaisių aromatų mišinį. Apskritais lapeliais puošiami konditeriniai gaminiai, aromatizuojamas stalo vanduo ir gaivieji gėrimai. Augalai gausiai lankomi bičių.	
Pipirmėtės <i>Mentha x piperita</i>	18000	Augalai 40–60 cm aukščio, sėtinį į daigyklas. Vartotini švieži ir džiovinti lapai.	
Paprastieji raudonėliai <i>Origanum vulgare</i>	7500	Medingi 30–60 cm aukščio augalai, sėtinį tiesiai į dirvą. Maistas gardinamas šviežia ir džiovinta žole. Vaistinėms arbatoms ruošti pjaunamos žydinčių augalų viršūnės.	
Kvapieji rozmarinai <i>Rosmarinus officinalis</i>	800	Augintini vazonuose arba lengvoje dirvoje, šiltoje saulėtoje vietoje. Augalai neatsparūs šalčiui, todėl žiemai įnešami į patalpas. Maistui vartotini švieži ir džiovinti lapeliai.	
Vaistiniai šalavijai <i>Salvia officinalis</i>	130–150	Augalai užauga iki 70 cm aukščio, vaistiniai, medingi. Vartotini švieži ir džiovinti lapai. Sėklos sėtinamos į daigyklas.	
Siauralapiai šatreiniai <i>Diplotaxis tenuifolia</i>	4000	20–25 cm aukščio daugiamečiai augalai, dažniausiai augintini kaip vienmečiai. Labai vertinami ir vartotini pikantiško skonio lapai.	

BRAŠKĖS, ŽEMUOGĖS		
BRAŠKIŲ veislės		
Veislė	Aprašymas	
GRANDIAN F ₁	Itin derlinga hibridinė veislė iš Nyderlandų, pritaikyta auginti tiek profesionaliems augintojams, tiek daržininkams mėgėjams. Augalai 10–20 cm aukščio, remontantiniai, todėl dera visą sezoną iki šalnų. Tinkami auginti lysvėse, vazonuose ar loveliuose. Uogos stambios, iki 20–25 g svorio, apie 3 cm skersmens. Minkštumas tvirtas, saldus ir labai kvapus.	 GRANDIAN F ₁
TRESKA	Ankstyva veislė. Derėti pradeda jau po 4 mėnesių nuo daigų pasodinimo. Augalai išaugina nedaug ūsų. Uogos stambios, tamsiai raudonos, tvirtos, sultingos ir skanios.	
ŽEMUOGIŲ veislės		
Veislė	Aprašymas	
YELLOW WONDER	Augalai kompaktiški, 15–20 cm aukščio, ūsų neišaugina. Vienoje vietoje gali augti 3–4 metus. Uogos saldžios, labai skanios ir kvapios, tinka dietinei mitybai. Dera visą sezoną. Geltonos uogos mažiau pastebimos paukščių.	 YELLOW WONDER
RED WONDER	Kereliai 15–20 cm aukščio, ūsų neišaugina. Vienoje vietoje gali augti 3–4 metus. Uogos raudonos, didelės, itin skanios, saldžios ir kvapios. Dera iki pat šalnų.	 RED WONDER
REGINA	Vienoje vietoje augalai gali augti keletą metų. Derėti pradeda po 3,5–4 mėnesių nuo daigų pasodinimo ir dera iki pat šalnų. Uogos stambios, gražios formos, labai skanios ir kvapios. Augalai neišaugina ūsų. Galima auginti balkone.	 REGINA

SVOGŪNŲ SĖJINUKAI



SVOGŪNŲ SĖJINUKŲ veislės		
Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
BIRNFÖRMIGE	V	Ropelės stipriai ištempto ovalo formos, todėl jas patogų pjaustyti žiedais. Lukštai tvirti, šviesiai rudi, gerai priglundę. Tinka trumpai sandėliuoti.
BIZTRO	A	Daugializdžių svogūnų veislė. Augalai nelinkę žydėti. Ropelės apvalios, šviesiai rausvu vidumi, raudonai rudais lukštais, švelnaus skonio. Tinka ilgai sandėliuoti.
CUPIDO F ₁	A	Ropelės apvalios. Jauni augalai tinkami realizuoti su laiškais. Derlių galima imti jau liepos pirmoje pusėje. Tinka sandėliuoti.
CORRADO F ₁	VA	Hibridas idealiai tinka auginti Lietuvos klimato sąlygomis. Ropelės ovaliai apvalios, tinkamos ilgai sandėliuoti. Lukštai gerai priglundę. Derlių galima imti jau liepos viduryje.
CRUSADO F ₁	A	Vienas iš geriausių hibridų. Dėl itin stiprios šaknų sistemos išaugina gausesnį derlių nei kitos veislės, ypač sausomis vasaromis. Ropelės užauga apvalios, su plonu kakleliu. Tinka pervežti, ilgai sandėliuoti.
SETTON	VA	Ropelės vidutinio dydžio, apvalios, švelnaus skonio. Lukštai bronzškai auksinės spalvos, gerai priglundę. Tinka sandėliuoti per žiemą.
STURON	VA	Tai viena iš populiariausių veislių tiek tarp profesionalių augintojų, tiek tarp mėgėjų. Ropelės išauga apvalios. Kaklelis vidutiniškai storas. Svogūnai gerai dera, tinkami sandėliuoti.
STUTTGARTER RIESEN	A	Derlinga veislė. Ropelės plokščios, geltonos, vidutiniškai aštraus skonio. Tinka ilgai sandėliuoti.
SNOWBALL	VA	Veislė unikali dėl savo baltos spalvos. Ropelės apvalios, vidutinio storio kakleliu, saldesnės ir švelnesnio skonio nei geltonųjų svogūnų, tinka trumpai sandėliuoti.
RED KARMEN	VA	Ropelės plokščiai apvalios, tamsiai violetiniu lukštu. Minkštimas baltas, su tamsiai raudonais žiedais, švelnaus skonio. Labai tinka sandėliuoti iki žiemos vidurio.
ROMY	VA	Ropelės apvalios, nuo tamsiai raudonos iki violetinės spalvos, plonu kakleliu, tinkamos trumpai sandėliuoti. Lukštai tvirti, gerai priglundę.

SĖKLINĖS BULVĖS



SĖKLINIŲ BULVIŲ veislės		
Veislė	Ankstyvumas	Aprašymas
AGATA	LA	Gumbai ovalūs, geltona odele ir gelsvu minkštimu, sekliomis akutėmis, išvirti nesubyra. Gumbai vidutinio dydžio, vienodi. Veislė atspari virusams, bulvių vėžiui, vidutiniškai atspari marui, rauplėms, bulviniams nematodams.
ALOUETTE	A	Naujos kartos veislė, atspari marui, rauplėms, bulvių vėžiui, nematodams ir sausrai. Gumbai ištempto ovalo formos, raudona odele ir geltonu minkštimu, labai skanūs. Rekomenduotina auginti ekologiniuose ūkiuose.
BABYLON	VA	Gumbai ištempto ovalo formos, dideli, geltona odele ir vidumi, turtingi sausųjų medžiagų, miltingi, verdant subyra. Augalai atsparūs daugeliui virusų, bulvių rauplėms. Augintini pagrindiniam derliui gauti. Gumbai tinkami ilgai sandėliuoti.
ESMEE	VA	Gumbai užauga dideli, ištempto ovalo formos, raudona odele, sekliomis akutėmis ir geltonu minkštimu, išvirti nesubyra. Augalai gerai ištveria karščius, atsparūs rauplėms ir nematodams.
LEVANTE	A	Naujos kartos veislė. Gumbai ištempto ovalo formos, geltona odele ir šviesiai geltonu vidumi, išvirti pusiau subyra, labai skanūs. Augalai atsparūs marui, virusams ir nematodams. Po keru susiformuoja labai daug gumbų. Rekomenduotina auginti ekologiniuose ūkiuose.
LUGANO	A	Gumbai dideli, ištempto ovalo formos, geltona odele ir gelsvu vidumi. Išvirti pusiau subyra, skanūs. Augalai labai atsparūs cistas sudarantiems nematodams ir bulvių rauplėms. Veislę tinka auginti bet kokiame dirvožemyje. Veislės ramybės periodas ilgas.
RIVIERA	LA	Patį ankstyviausią „Agrico“ firmos veislę. Gumbai apvaliai ovalūs, šviesiai gelsva luobele ir minkštimu, sekliomis akutėmis, išvirti nesubyra. Gumbai dideli, vienodi. Veislė atspari bulvių vėžiui, bulviniams nematodams, fuzariozei.
TWISTER	A	Gumbai apvaliai ovalūs, geltona odele ir gelsvu vidumi. Verdant nesubyra. Veislės ramybės periodas ilgas. Augalai atsparūs lapų ir gumbų marui, rauplėms, geltoniesiems nematodams. Rekomenduotina auginti ekologiniuose ūkiuose.



ALOUETTE



LEVANTE



TWISTER

ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI, PAŠARINIAI ŠAKNIAVAISIAI

ŽOLIŲ SĖKLŲ mišiniai		
Mišinys	Pakuotė (kg)	Aprašymas
PRESTIŽAS	0,5 10	Žolių sėklų mišinys, skirtas lėtai augančioms labai puošnioms reprezentacinėms vejoms įrengti. Mišinys sudarytas iš Vakarų Europoje išaugintų sertifikuotų dekoratyvinių žolių veislių sėklų. Sudėtyje esantys trijų tipų eraičinai puikiai dera tarpusavyje ir su pievinėmis miglėmis, todėl veja išauga tanki, minkšta ir labai dekoratyvi. Tinka prestižinėms zonoms apželdinti. Gerai auga saulėtose vietose ir pusiau pavėsyje.
POILSIS	0,5 10	Dekoratyvus, atsparus mindžiojimui, greitai ir gerai ataugantis mišinys, sudarytas iš Vakarų Europoje išaugintų specialių dekoratyvinių žolių sėklų. Sudėtyje esantys trijų eraičinų tipai papildo vienas kitą, puikiai dera su pievinėmis miglėmis ir daugiametėmis svidrėmis. Išaugusi veja būna graži, tanki, minkšta, atspari mindžiojimui, greitai ir gerai atauga po renginių.
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ	0,2 3	Dekoratyvus, atsparus mindžiojimui, greitai ataugantis žolių sėklų mišinys. Veja gerai auga įvairių tipų dirvožemiuose, atspari mindžiojimui, greitai atželia ir užpildo tuščius tarpus.
MIŠINYS PIEVOMS IR GANYKLOMS	5	Mišinys pievoms ir ganykloms sudarytas iš daugiamečių svidrių, motiejukų, miglių, eraičinų bei baltųjų dobilų sėklų. Šis mišinys sukuria tankią velėną, atsparią mindymui ir užtikrina greitą pievos atžėlimą.

PAŠARINIŲ ŠAKNIAVAISIŲ veislės	
Veislė	Aprašymas
BRIGADIER	Labai populiari daugiadaigių runkelių veislė iš Nyderlandų. Šakniavaisiai stambūs ar labai stambūs. Didesnė runkelio dalis auga virš žemės, todėl juos lengva rauti.
REKORD POLY	Derlinga daugiadaigių runkelių veislė. Šakniavaisiai stambūs, raudoni, 3/4 gumbo auga virš žemės, todėl juos patogų rauti rankomis. Runkelių paviršius lygus, tad išrovus juos lengva valyti.
URSUS POLY	Daugiadaigių runkelių veislė, atspari sausroms. Šakniavaisiai geltoni, cilindro formos. Didesnė runkelio dalis auga virš žemės, todėl jie lengvai išraunami rankomis.
ZENTAUR POLY	Daugiadaigė puscukrinių pašarinių runkelių veislė. Šakniavaisiai stipriai ištempto ovalo formos, balta odele, išsiskiria didesniu sausųjų medžiagų kiekiu. 2/3 arba 1/2 šakniavaisio dalis yra iškilusi virš žemės, todėl yra žalsva. Saugyklose išsilaiko iki vėlyvo pavasario.

DARŽOVIŲ SĖKLOS

Rūšis	Sėklų skaičius 1 g	1000 sėklų svoris (g)	Augalų skaičius 1 ha (tūkst.)	Sėklų dygimas		Sėjos norma kg/ha
				Optimali temperatūra C°	Dienų skaičius	
Agurkai	30–35	29–33	12–20	25–30	4–5	1,5–2
Arbūzai	12–25	40–83,3	5–15	21–35	4–6	
Baklažanai	200–250	4–5		24	10	
Burokėliai	40–70	14–25	300–600	15	10	7–14
Cukinijos	6–8	125–170	10–16	24	6–8	2–4
Kopūstai	250–350	3–4	25–50	15–18	10	0,3–0,4
Žiediniai kopūstai	250–400	2,5–4	15–30	15–18	10	0,2–0,3
Krapai	600–800	1,2–1,8		15–20	15–20	4–12
Melionai	22–41	45,5–24,4	4–12	22–35	4–7	
Moliūgai	4–12	145–335	10–12	20–25	6–8	
Morkos	500–1000	1–2	1000–2000	15	15	1,5–3
Petražolės	600–800	1,3–1,7	800–1200	20–25	10–15	4–7
Paprikos	100–125	8–10		25–28	10	
Pomidorai	250–350	3–4		20–25	8	
Porai	300–400	2,5–3,3	150–250	12–18	10–20	1–1,5
Pupelės grūdams	0,7–1,5	670–1400	60–80	12	10	60–130
Šparaginės pupelės	2–6	170–500	200–250	12	10	60–100
Pupos	1–2	500–1000	100–140	12	10–15	200–300
Ridikai	120–150	6,6–8,3		15	6–8	6–8
Ridikėliai	70–120	8,3–14,3	3000–5000	15	6–8	20–40
Ropės	400–600	1,7–2,5	500–800	15–18	5–7	3–5
Salierai	2500–3000	0,3–0,4	50–70	18–22	15–20	0,1–0,2
Salotos	600–1000	1–1,7	90–120	15–20	5–10	1–1,5
Salotinės sultenės	400–1000	0,4–1	3000–6000	10–12	10–15	6–8
Svogūnai	250–300	3,3–4	800–1000	15	10–15	4–6
Špinatai	100	10	400–500	10	8	20–30
Žirniai	2,5–6	160–400	400–500	10	10–15	120–200



www.sekluva.lt